



IRAN
NATIONAL
ANTI
DOPING
ORGANIZATION



در اثر قطع ناگهانی مصرف این داروها نیز ممکن است نارسایی حاد فوق کلیه دیده شود که علایمی مانند: تب، درد عضلانی، درد مفاصل و بیقراری خواهد داشت. ایجاد تومور کاذب در مغز همراه ادم عروق ته چشم نیز یک عارضه بسیار نادر است. بطور کلی عوارض موضعی این داروها از عوارض سیستماتیک آن بسیار کمتر است.

عوارض دوپینگ

نسخه هندی: گلوکوکورتیکو استروئیدها
ناشر: سناد ملی مبارزه با دوپینگ، کمیته آموزش و پیشگیری
گردآورنده: دکتر حمید زعیم کهن
آدرس: تهران، بزرگراه ایباش، مجموعه ورزشی انقلاب،
ساختمان ورزش پاکد، طبقه سوم
تلفن: ۲۲۰۹۹۱۱۹ شماره: ۲۲۰۱۴۵۲۴

Doping Side Effects

Part 7 : Beta2 agonists

By: Dr. Hamid Zaemikohan

Iran National Anti Doping Organization

Clean Sport Building,

Enghelab Sport Complex,

Nayesh Highway, Tehran/Iran

TEL: +982122044114

FAX: +982122013524

Email: iranado@gmail.com

Website: <http://www.iranado.ir>

Designer: P. Gholizadeh 0912 544 68 09

♦ مصرف این داروها چه عوارضی خواهد داشت؟

عوارض جانبی این داروها در گروه قابل بحث و بررسی است؛ یکی عوارضی که در اثر مصرف مستمر و طولانی آنها ایجاد می شود و دیگری عوارضی است که در اثر قطع مصرف این مواد بوجود می آید.



مهمترین عوارضی که در اثر مصرف مستمر و طولانی مدت گلوکوکورتیکوئیدها ایجاد می شود عبارتست از: اختلالات آب و الکترولیتها، پرفشاری خون، افزایش قند خون و دیده شدن قند در ادرار، زخمهای دستگاه گوارش، یوکی استخوان، بیماریهای عضلانی و تحلیل عضلانی، اختلالات مغزی، اختلالات روانی و رفتاری، هیپاتیت، کم خونی آپلاستیک، آب مرواید، توقف رشد در نوجوانان، چاقی تنه ای، ترکهای پوستی، کبودی، آکنه و پرمویی.